

Oltások összehasonlítása orvosoknak gyakorlati alapon. Forrás: OGYÉI honlap

	Pfizer/Biontech Comirnaty	Moderna	Astra Zeneca	Szputnyik	Sinopharm
Oltás típusa	mRNS	mRNS	DNS vektor	DNS vektor	Elölt teljes vírus
Tárolás ideje 2-8 C fokon	5 napig lehet bontatlanul. Higítottan 6 h belül fel kell használni	30 napig bontatlanul. Felbontás után 6 h belül fel kell használni	Bontatlanul 6 hónap. Átszírt ampulla 48 h belül felhasználandó	- 18 C fokon 6 hónap. Kiolvasztás után 2 óráig lehet szobahőmérsékleten	Előretöltött fecskendők , 2 évig tárolható. Nem fagyasztható
Oltási séma – 2 dosis	3 hét különbség 0,3 ml	4 hét különbség 0,5 ml	4 – 12 hét különbség 0,5 ml	3 hét különbség 0,5 ml	3-4 hét különbség 0,5 ml
Abszolút ellenjavallat	Készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység	Készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység	Készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység	Készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység, Korábbi súlyos anafilaxia	Készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység, Korábbi súlyos anafilaxia
Időskori ellenjavallat (Hatásosság csökkent lehet)	Nincs	Nincs	Nincs, de hatásosságára 55év felett még nincs elég adat	Nincs	Nincs, de hatásosságára 60év felett még nincs elég adat
Acut lázas betegség	Relatív ellenjavallt – halasztani kell	Relatív ellenjavallt – halasztani kell	Relatív ellenjavallt – halasztani kell	Relatív ellenjavallt – halasztani kell	Relatív ellenjavallt – halasztani kell
Chr. Betegség – esetleges ellenjavallat	Nincs leírt korlátozás	Nincs leírt korlátozás	Nincs leírt korlátozás	krónikus vesebetegség vagy májbetegség, endokrin betegségek (jelentős eltérések a pajzsmirigyfunkción értékekben és nem megfelelően kezelt cukorbetegség), heveny szívbetegség, epilepsia ill. egyéb idegrendszeri betegség, tumoros betegségek, súlyos vérképzőszervi betegségek	Azon személyeknél, akiknél a krónikus betegség nincs megfelelően egyensúlyban, vagy krónikus betegség akut fellángolása esetén
Immunszuppresszáltak (Hatásosság az immunszupprimáltaknál kisebb lehet)	Nem vizsgálták, hatásossága az immunszuppresszált személyek esetében kisebb lehet.	Nem vizsgálták, hatásossága az immunszuppresszált személyek esetében kisebb lehet.	Nem vizsgálták, hatásossága az immunszuppresszált személyek esetében kisebb lehet.	Autoimmun betegségben ellenjavallt. Hatásossága az immunszuppresszált személyek esetében kisebb lehet.	Körültekintéssel alkalmazható. Hatásossága az immunszuppresszált személyek esetében kisebb lehet.
Termékenységre való hatás	Állatkísérletek nem igazoltak direkt vagy indirekt káros hatásokat	Állatkísérletek nem igazoltak direkt vagy indirekt káros hatásokat	Állatkísérletek nem igazoltak direkt vagy indirekt káros hatásokat	Nincs adat	Nincs adat
Terhesség - szoptatás	Korlátozott mennyiségű tapasztalat, haszon-kockázat mérlegelése után alkalmazható csak	Korlátozott mennyiségű tapasztalat, haszon-kockázat mérlegelése után alkalmazható csak	Korlátozott mennyiségű tapasztalat, haszon-kockázat mérlegelése után alkalmazható csak	ellenjavallt	ellenjavallt